

メマンチン塩酸塩OD錠「ZE」

を服用される患者様のご家族・介護者の方へ



このお薬は中等度及び高度アルツハイマー型認知症における症状の進行を抑制するお薬です。



このお薬は口腔内崩壊 (OD) 錠といい、普通の薬と同じように水で飲ませることもできますが、水と一緒になくても飲ませられるタイプの薬です。

お薬の飲み方

- ◎舌の上でだ液で湿らせて軽くつぶさせてから、だ液 (又は少量の水) と一緒に飲ませてください。
普通の薬と同じように水 (またはぬるま湯) で飲ませることもできます。
- ◎寝たままの状態では水なしでは飲ませないでください。起き上がることが困難な場合は、少し上体をおこし、水 (またはぬるま湯) で飲ませてください。

メマンチン塩酸塩OD錠「ZE」

を服用される患者様へ



このお薬は中等度及び高度アルツハイマー型認知症における症状の進行を抑制するお薬です。




お薬の飲み方

- ◎PTP シートから取り出してから服用してください。
- ◎このお薬は次の2通りの方法で飲むことができます。
 - ①舌の上でだ液で湿らせてからだ液といっしょにお飲みください。
 - ②普段のお薬と同じように水またはぬるま湯でお飲みください。**①, ②いずれの飲み方でも効き目は変わりません。**
- ◎飲むときは、体を起こして水またはぬるま湯で飲んでください。寝たままの状態では飲まないでください。

メマンチン塩酸塩OD錠[ZE]の服用について


このお薬は、はじめは、1日1回5mgから服用を開始し、1週間ごとに5mgずつ量を増やしてゆきます。4週目以降は1日1回20mgを服用します。



このお薬の主な副作用

お薬の飲みはじめに以下のような症状が現れることがあります。また、これらの症状により転倒することがありますので、注意してください。

・めまい



・眠気で
ぼんやりする



症状が強い場合は主治医または薬剤師に相談してください。


- ☑飲み忘れても絶対に2回分を一度に飲んではいけません。次の日から主治医の指示どおり、きちんと飲んでください。
- ☑服用中のお薬がある場合や、誤って多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- ☑主治医の指示なしに服用を中止しないでください。

施設名：

メマンチン塩酸塩OD錠[ZE]の服用について

このお薬は症状に合わせて適切な量を服用することが大切です。

はじめは、1日1回5mgから服用を開始し、1週間ごとに5mgずつ量を増やしてゆきます。4週目以降は1日1回20mgを服用します。



飲みはじめに注意いただきたいこと

このお薬は、飲みはじめたときに、めまいや眠気でぼんやりすることがあるのでこれらの症状があらわれた場合には医師に相談してください。また、これらの症状により転倒することがありますので、注意してください。

- ☑飲む回数や量を間違わないように、お薬はできるだけご家族や介護者が管理してください。
- ☑飲み忘れても絶対に2回分を一度に飲ませてはいけません。次の日から主治医の指示どおり、きちんと飲ませてください。
- ☑服用中のお薬がある場合や、誤って多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- ☑主治医の指示なしに服用を中止しないでください。

施設名：