

モサプリドクエン酸塩錠2.5・5mg「ZE」

を服用される患者様へ

このお薬は、消化管の運動機能を改善する薬です。
消化管運動を促すことにより、胸やけや吐き気、嘔吐などの
消化器症状を改善します。

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」



モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」



このお薬を服用するときは、以下の点にご注意ください。

- 主治医または薬剤師に指示された飲む量および回数を守ってください。

飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、飲む時間が近い場合は1回とはして、次の時間に1回分飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

誤って多く飲んだ場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

指示された期間飲んででも症状が良くなつたと感じない場合は、その旨を主治医に伝えてください。

- 別に薬を飲んでいる場合は、主治医または薬剤師に伝えてください。胃腸の痛み止めなど、本剤の効果を弱めることがあります。

1
回
分



お薬は効果と副作用の両面を持ち合わせています。
副作用がみられても早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
主治医または薬剤師の指示に従い、たたく飲みましょう。

このお薬で注意してほしい副作用

げきしょうかんえん かんきのうしょうがい おうだん
劇症肝炎、肝機能障害、黄疸

- ◆ 肝臓の副作用です。
- ◆ 次のような症状のいくつかが同じ時期にみられれば、「**劇症肝炎、肝機能障害、黄疸**」の可能性がります。
ただちに服用を止めて、すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。

全身がだるい




食欲がない



吐気がする・吐く



皮膚や白目が黄色くなる



尿の色が濃い
(茶褐色になる)



発熱、発疹、そう痒感など

このほかにもお薬を飲んで体調がおかしいと感じたら主治医または薬剤師に相談ください。

施設名：