


# プレガバリンOD錠「ZE」を服用される患者さんと そのご家族の方へ

- プレガバリンOD 錠「ZE」は神経の痛みに対するお薬です。
- 飲み始めてから、1 週間以上かけて徐々に用量を増やしていきます。
- 効果発現までに時間を要しますので、服用開始直後の効果がなくとも数日は服用を続けてください。
- 痛みが軽減してきたらお薬をやめることも可能です。

お薬の量や服用方法等については、自分で判断せず、必ず  
医師の指示に従ってください。

## プレガバリンOD錠「ZE」

プレガバリンOD錠  
25mg「ZE」



(実物大)

プレガバリンOD錠  
75mg「ZE」





(実物大)

プレガバリンOD錠  
150mg「ZE」



(実物大)



唾液のみ(水なし)で口の中で溶けるお薬ですが、コップ1杯程度の  
水またはぬるま湯で飲むこともできます。

# プレガバリンOD錠「ZE」を服用するにあたってのご注意

- このお薬は、めまいや眠気、意識消失などがあらわれることがあります。
  - 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
  - 服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。
- 人により体重が増えることがありますので、定期的に体重測定を行い、体重が増え始めた場合には、ご相談ください。
- 腎臓が悪い方、透析をうけている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ずご相談ください。
- アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 誤って多く服用した場合はご相談ください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分をできるだけ早く飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談ください。
- 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。
- ほかにお薬を服用している場合(薬局で買ったお薬も)、必ずお伝えください。



気になる症状がある場合、わからないことがある場合は、  
医師または薬剤師にご相談ください。

施設名