







ピタバスタチンカルシウム錠「ZE」

を服用される患者さんへ

このお薬は、高コレステロール血症の治療薬です。
肝臓でのコレステロール合成を阻害し、
血液中のコレステロールを減らします。

製品名	錠剤	PTPシート
ピタバスタチン カルシウム錠 1mg「ZE」	 1mg	
ピタバスタチン カルシウム錠 2mg「ZE」	 2mg	
ピタバスタチン カルシウム錠 4mg「ZE」	 4mg	

主治医または薬剤師に指示された
用法・用量を守ってください。

- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- 指示なしに、ご自分の判断で飲むのを止めないでください。

(裏面に つづく)

お薬は効果と副作用の両面を持ち合わせています。
副作用がみられても早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
主治医または薬剤師の指示に従い、ただしく飲みましょう。

このお薬でおこることが知られている副作用

おうもんさんゆうかいしょう 横紋筋融解症

◆ 筋肉の副作用です。

◆ 次のような症状のいくつかが同じ時期にみられれば「横紋筋融解症」の可能性が
あります。
ただちに服用を止めて、すぐに主治医または薬剤師に連絡してく
ださい。

筋肉が痛い



手足のしびれ・けいれん

手足に力が入らない



歩行困難 など

尿の色が濃い
(赤褐色になる)



肝機能障害・黄疸

◆ 肝臓の副作用です。

◆ 次のような症状があらわれたら「肝機能障害・黄疸」の可能性が
あります。
服用をやめて、まず、主治医または薬剤師にご相談ください。

体がだるい

吐き気・嘔吐

食欲不振

白目や皮膚が黄色くなる

かゆみ など

このほかにもお薬を飲んで体調がおかしいと感じたら
主治医または薬剤師に相談ください。

施設名：